

## กรอบที่ 15

### ปัญหาโรคเอดส์

- |           |   |
|-----------|---|
| รหัส 3510 | จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเอดส์                                   |
| รหัส 3511 | การตรวจหาเชื้อ HIV มีขั้นตอนอย่างไร                           |
| รหัส 3512 | วิธีป้องกันโรคเอดส์   |
| รหัส 3513 | วิธีการรักษาโรคเอดส์  |
| รหัส 3514 | การดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อ HIV                                 |
| รหัส 3515 | ติดเชื้อแล้ว จะทำตัวทำใจให้รับสภาพได้อย่างไร                  |
| รหัส 3516 | ตั้งครรภ์และติดเชื้อจะทำอย่างไร                               |
| รหัส 3517 | การจูน การใช้ปาก ใช้มือสัมผัสอวัยวะเพศของอีกฝ่ายจะติดเอดส์ไหม |
| รหัส 3518 | เอดส์เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนใช่หรือไม่             |
| รหัส 3519 | ทำหมันแล้วมีเพศสัมพันธ์ จะติดเอดส์หรือไม่                     |
| รหัส 3520 | หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว 3 เดือน ถ้าติดเชื้อจะมีอาการอย่างไร  |
| รหัส 3521 | สถานที่ทำการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ                              |

## รหัส 3510 ຈະສູດເອົາຍາໄວວ່າເປັນເອດສ໌

อารียา ทรงสิทธิ์ชัก \*

ເອດສ໌ ເປັນກາວຄຸມືກັນໂຮຄບກພວ່ອງເກີດຈາກເຊື້ອໄວຮ່າຍນິດຫົ່ງເຮັກສັ້ນໆ ວ່າເຊື້ອ HIV ຄູນຈະທຽບວ່າຕິດເຊື້ອໄວຮ່າຍນິດນີ້ໄດ້ຈາກການຕຽບແລ້ວ ທີ່ທີ່ກິດເຊື້ອ HIV ຈະມີການແປ່ງເປັນ 3 ຮະຍະກື່ອ  
ຮະຍະທີ່ 1 ໄນມີການອະໄໄລຍະຮະຍະນີ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈະມີສຸຂພາພເໝຶ່ງແຮງເປັນປົກທີ່ອາຈານມີ ອາກເປັນໄຟ້ດໍາໆ ປັດສິරຍະ ປັດເມື່ອຍາມຕັກລ້າຍເປັນໄຟ້ຫວັດຮຽມຄາ

ຮະຍະທີ່ 2 ຮະຍະເຮັມປຣາກຄູມອາກເຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກມີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນເປັນໄຟ້ເຮືອຮັງນ້າຫັກຄລ ອຸຈາຮະຮ່ວງເຮືອຮັງ ຕ່ອມນ້າເຫຼືອງໂຕ ມີຝ່າງວາທີ່ລື້ນແລະລໍາຄອ ທີ່ອາກເຫັນນີ້ເກີດບື້ນເຮືອຮັງໂດຍໄມ່ທຽບສາເຫຼຸ

ຮະຍະທີ່ 3 ຮະຍະໂຮຄເອດສ໌ເຕັມບັນ ຮະຍະນີ້ຜູ້ກັນຂອງຮ່າງກາຍເສີຍໄປມາກ ຈຶ່ງເກີດອາກເຕີດເຊື້ອໃນຮະບນຕ່າງໆ ໄດ້ຈ່າຍ ໂດຍຈາກມີການເໜີມອນຮະຍະທີ່ 2 ແລະ ຈາກເກີດການຕິດເຊື້ອຂອງຮະບນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການຕິດເຊື້ອຂອງຮະບນທາງເດີນອາຫານ ຮະບນທາງເດີນຫາຍໃຈ ທີ່ຮັບສາເຫຼຸ ໃນນາງຮາຍຈາກມີການສມອງເລື່ອມອາກເຮົາ

ຂອງໂຮຄມະເຮົງຕ່ອມນ້າເຫຼືອງຫຼືອມະເຮົງປາກນດລູກແລະສ່ວນໄໝໝູ່ຜູ້ປ່າຍໂຮຄເອດສ໌ເມື່ອມີການຄືງຮະຍະທີ່ 3 ແລ້ວ ຈາກເສີຍໜີວິຕາຍໃນ 2-4 ປີຈາກໂຮຄຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ທີ່ວັກຍາໄມ່ຫາຍ

ຫາກຄູນມີການດັ່ງກ່າວໜ້າງຕົ້ນ ອຢ່າເພີ່ງວິຕົກກັງລວ່າຄູນຈະເປັນເອດສ໌ ເພຣະມີສາເຫຼຸ ນາກມາຍທີ່ກຳໄໝໃຫ້ເກີດອາກເຫັນນີ້ໄດ້ ຖາງທີ່ດີຄູນກວ່າໄປພົບແພທ໌ເພື່ອຕຽບໃຫ້ແນ່ໄວ

ຄ້າຄູນຍັງມີປັບປຸງຫາຫຼືອື່ນສັບໂທຮມາຄຸຍກັນເຮົາໄດ້ທີ່ໜາຍເລຂ 02-526-3342 ຕລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

---

\*ນັກຈິຕວິທາ 4 ສໍານັກພັດນາສຸຂພາພິຕ

## รหัส 3511 การตรวจหาเชื้อ HIV มีขั้นตอนอย่างไร

อารียา ทรงสิทธิโชค \*

การตรวจหาเชื้อ HIV การตรวจเมื่อคุณมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มิใช่คู่ الزوج หรือคุณเองมีอาชีพในการให้บริการทางเพศ เกยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือเมื่อคุณอนของคุณติดเชื้อ HIV

ในการตรวจหาเชื้อ HIV ควรอุปกรณ์ 1-3 เดือนหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจะได้ผลที่แน่นอนกว่า และระหว่างนั้นหากจะมีเพศสัมพันธ์กับครัวเรือนเดียวกันอย่างเดียว ควรรีบตรวจต่อไป

ขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อ HIV อันดับแรกจะเป็นการตรวจขั้นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ราคาถูก และได้ผลเร็ว แต่หากผลการตรวจขั้นต้นมีผลเลือดเป็นบวก คุณก็สามารถที่จะตรวจยืนยันผลได้อีกรอบหนึ่ง ด้วยวิธีที่ซับซ้อนกว่า และใช้เวลานานกว่าเจิงจะรู้ผล แต่จะได้รับผลที่ค่อนข้างแม่นยำ การตรวจหาเชื้อ HIV สามารถรับบริการได้ที่คลินิกนิรนาม และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

หากคุณกังวลกับการตรวจเลือด ทางสถานพยาบาลต่างๆ จะมีผู้ให้คำปรึกษาแก่คุณ และที่สำคัญผลการตรวจของคุณจะเป็นความลับ ดังนั้นหากคุณสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าคุณติดเชื้อ HIV หรือไม่ คุณควรไปตรวจเพื่อความสบายใจและจะได้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

หากคุณยังมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3512 วิธีป้องกันโรคเอดส์

อารียา ทรงสิทธิโชค \*

โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ การใช้เข็ม หรือ อุปกรณ์น้ำดื่มร่วมกัน การติดต่อทางกระแสเลือด เช่น ไดรับเดือดจากบุคคลอื่น หรือจากการยาที่ติดเชื้อ ไปสู่ทางกินครรภ์

ดังนั้น โรคเอดส์จึงสามารถป้องกันได้ ดังนี้

1. การมีเพศสัมพันธ์ต้องแน่ใจว่าคู่ของไม่มีเชื้อเอดส์หากไม่แน่ใจควรสวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

2. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขายบริการทางเพศ หรือชาย-หญิงที่มีคู่นอนหลายคน หรือมี เพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มิใช่คู่ของตน ควรตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ ถ้าพบจะได้ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ ไปถึงผู้อื่นอีก

3. ก่อนแต่งงานควรตรวจเอดส์ทั้งชายและหญิง และเมื่อแต่งงานแล้วควรมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวโดยไม่นำตัวเองไปรับเชื้อหรือไม่นำเชื้อมาแพร่ให้คู่ของ หากแพล้อนอกใจคู่ของต้องกล้า บอกความจริง และควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลา มีเพศสัมพันธ์กับคู่ของจนกว่าจะตรวจให้แน่ใจว่า ไม่ติดเชื้อเอดส์

4. สมรสที่ติดเชื้อเอดส์ควรขอรับคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ เพราะเชื้อเอดส์สามารถผ่านไปยังทารกในครรภ์ได้

5. ถ้าจำเป็นต้องใช้เข็มฉีดยา ต้องใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดและไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น โรคเอดส์ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3513 วิธีการรักษาโรคเอดส์

อารียา ทรงสิทธิโชค \*

ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีวิธีการรักษาโรคเอดส์ให้หายขาด ได้แต่ก็มีวิธีการรักษาการติดเชื้อเอชพีวีอย่างได้ และการรักษาอาจช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ยืนยาวขึ้น การรักษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อและการอื่นๆ เช่น เป็นไข้ ท้องเสีย น้ำหนักลด ซึ่งในปัจจุบันมียาที่รักษาโรคติดเชื้อแทรกซ้อนหลายชนิดด้วยกัน
2. การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ แม้จะยังไม่มียาชนิดใดที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาด ได้แต่มียาที่สามารถช่วยหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอดส์ได้ เช่น ยา AZT เป็นต้น
3. การรักษาที่มุ่งเสริมหรือกระตุ้นภูมิต้านทานที่เสียไปในปัจจุบันมีการทดลองยาหลายตัว ในกลุ่มนี้ และคาดว่าหากใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอดส์ น่าจะได้ผลการรักษาที่ดี
4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ได้แก่ การให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การส่งเคราะห์ด้านอาชีพ รวมทั้งการรักษาทางจิตใจเพื่อผ่อนคลายความกดดันจากหลาย ๆ ด้าน

นอกจากการรักษาเหล่านี้แล้ว การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยองค์เป็นสิ่งสำคัญ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสมสมำเสมอ ลดเวนของมีนมาหรือยาเสพย์ติด การลดความเครียด และความวิตกกังวลด้วยการทำสมาธิ และการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

หากคุณยังมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3514 การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อ HIV

**ข้อมูลข้อมูล เพชรทัย\***

หากคุณติดเชื้อ HIV ร่างกายจะอ่อนแย ติดเชื้อโรคและเจ็บป่วยง่าย จึงควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการรับประทานอาหาร ต้องพยายามรับประทานให้ได้วันละ 3 มื้อ แม้จะไม่รู้สึกหิว ก็ตาม และเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย งดเว้นการดื่มสุราและของมึนเมา

- ด้านการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายให้พอเหมาะสมกับสภาพร่างกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

- ทางด้านจิตใจ ควรฝึกบริหารจิตด้วยการทำสมาธิเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย

- ด้านการพักผ่อน ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วันละ 6-8 ชั่วโมง และพยายาม ทำงานอดิเรกทำเพื่อให้เพลิดเพลินและคลายเครียด

- ด้านการมีเพศสัมพันธ์ ต้องไม่ไปรับเชื้อเพิ่ม โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และระมัดระวังในเรื่องการเกิดบาดแผลด้วย

- ด้านกำลังใจ ควรพูดคุยกับผู้ใกล้ชิด คู่สมรสหรือผู้ที่คุณคิดว่าจะช่วยเหลือให้กำลังใจ และเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับคุณได้ ถ้าคุณมีลูก Jongคิดถึงลูกของคุณ ต้องคิดอยู่เสมอว่าคุณมีกำลังรับพากษา พากษาด้วยการคุย จะได้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป

คุณลองปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ จะช่วยคุณได้ แม้ว่าคุณจะติดเชื้อ แต่คุณก็สามารถ มีชีวิตรเหมือนผู้อื่นได้ หากมีข้อสงสัย สามารถโทรมาคุยกับที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3515 ติดเชื้อแล้ว จะทำใจให้รับสภาพได้อย่างไร

**ข้อมูลข้อมูล เพชรทุม\***

สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะรู้สึกชื่อก และทำใจให้ยอมรับไม่ได้ ต่อมามีคุณไฝ คิดทบทวน และได้รับกำลังใจจากคนใกล้ชิด คุณก็จะเริ่มทำใจได้บ้าง และยิ่งคุณได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง จากแพทย์และพยาบาล คุณก็จะอยู่ได้อย่างมีความหวัง และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องไม่ไปรับเชื้อเพิ่มขึ้น ก็จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างปกติไปได้อีกนาน

แม้ว่าคนอื่นอาจแสดงท่าทางรังเกียจ คุณก็อย่าได้เสียใจ คุณต้องยอมรับว่าโรคเดดส์เป็น โรคที่น่ากลัว คุณเองก็ยังกลัว ดังนั้นคนอื่นๆ ก็ย่อมกลัวเป็นธรรมชาติ คุณควรช่วยลดความกลัวของพวกรา โดยการไม่เข้าไปใกล้ชิดถ้าเขาไม่ยินยอม ทำให้เขาไว้วางใจว่าคุณจะไม่ทำให้เขาติดเชื้อ เช่น ไม่ไปแตะ ต้องตัว หรือสัมผัสของใช้ของเขารู้ว่าหนทางการแพร่เชื้อนั้นมีอะไรบ้าง แสดงให้เขารู้ ว่าคุณยังมีชีวิตปกติ สามารถทำงานได้ สามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ คนอื่นก็จะเริ่มลดความกลัว และเริ่มยอมรับคุณมากขึ้น

หากมีข้อสงสัย อย่างได้คำแนะนำนำเพิ่มเติม สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่หมายเลข

02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3516 ตั้งครรภ์และติดเชื้อจะทำอย่างไร

**นายลักษณ์ เพชร์หมู\***

ผู้ที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อแล้วนั้นควรจะต้องไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับคำปรึกษา และการดูแลเป็นกรณีพิเศษ

หญิงตั้งครรภ์มักมีความว่าจะรอจนกระทั่งคลอดดีหรือจะทำแท้งดี ซึ่งการตัดสินใจว่าจะทำแท้งหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันพอสมควร แพทย์พยายามจะบอกถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งกับตัวเด็กและตัวแม่เอง จำเป็นอย่างยิ่งที่แม่จะต้องพิจารณาให้ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง

หากคุณยังสงสัย และอยากรู้ดูกับเรา โทรมาปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3517 การจูบ การใช้ปาก ใช้มือสัมผัสอวัยวะเพศของอีกฝ่าย จะติดเออดส์ใหม่

ข้อมูลภายนอก  
พชร์ทัย \*

การแพร่เชื้ออे�ดส์นั้นสามารถแพร่ได้ 3 ทาง คือ ทางเดือดและน้ำเหลือง ทางน้ำนมมารดา และ ทางสารคัดหลังและน้ำอสุจิ

- ในกรณีการใช้ปากกับอวัยวะเพศ จะไม่ติดเออดส์ หากไม่มีบาดแผลในช่องปากถ้ามีบาดแผลในช่องปาก คุณก็มีความเสี่ยง แต่ถ้าอีกฝ่ายใช้ถุงยางอนามัยก็จะป้องกันการติดเชื้อได้

- ในกรณีจูบปากกัน หากเป็นการจูบปกธรรมชาติ จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจาก เชื้ออे�ดส์ในน้ำลายมีปริมาณน้อย แต่ถ้าจูบแบบดุกดื่ม มีบาดแผลในปาก ก็มีความเสี่ยงได้

- การใช้มือสัมผัสอวัยวะเพศ ไม่มีอันตราย แต่หากมีมีบาดแผลก็อาจมีความเสี่ยงได้ เช่นกัน

หากคุณมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3518 เอดส์เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนไปหรือไม่

**ข้อมูลข้อมูล เพชรทุม\***

เอดส์สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์แล้วติดเอดส์ คือผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ โดยไม่ได้ป้องกันตัว หรือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หากไปเจอกุญแจที่ติดเชื้อออยู่แล้ว ก็จะทำให้พลอยติดเชื้อไปด้วย

ดังนั้น คุณจึงไม่ควรที่จะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือมีคู่นอนหลายคน ควรจะรักเดียวใจเดียว และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

หากคุณมีข้อสงสัย และต้องการคำปรึกษา โทรมาได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3519 ทำมันแล้วมีเพศสัมพันธ์ จะติดเออดส์หรือไม่

**นายลักษณ์ เพชรทุม\***

การทำมัน คือ การคุณกำนิดแบบดาวร เป็นวิธีการป้องกันการมีบุตรสำหรับผู้มีบุตรเพียงพอด้วย การมีเพศสัมพันธ์หลังจากทำมันแล้วนั้น ฝ่ายหญิงจะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอีก

แต่ไม่ว่าคุณจะทำมันแล้วหรือไม่ก็ตามคุณสามารถติดเชื้อได้หากไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อเออดส์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย

หากคุณมีข้อสงสัย สามารถโทรมาขอรับบริการปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3520 หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว 3 เดือน ถ้าติดเชื้อจะมีอาการอย่างไร

**นายลักษณ์ เพชร์หมู\***

ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโดยคุณไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หลังจากนั้นประมาณ 3 เดือน จะสามารถตรวจพบเชื้อ HIV ในร่างกายได้โดยการตรวจเลือด และคุณจะสามารถแพะร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้แต่ตัวคุณเองจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ปรากฏออกมานะ คุณจะยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ

หากคุณทราบผลเดียวว่าคุณติดเชื้อเอดส์แล้ว ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือผู้ให้คำปรึกษา บุคคลเหล่านี้จะแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้คุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และยังมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง

หากคุณต้องการปรึกษากับเรา โทรมาได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

---

\*นักอาชีวบำบัด 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

## รหัส 3521 สถานที่ให้การส่งเคราะห์ผู้ติดเชื้อ

อารียา ทรงสิทธิโชค \*

สถานที่ให้การส่งเคราะห์ผู้ติดเชื้อ เออดส์มีมากมายหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด แต่ในที่นี่จะบอกถ้าสถานที่หลักๆ ในการให้บริการ ดังนี้

คลินิกนิรนาม (สภากาชาดไทย)	หมายเลขโทรศัพท์	02-256-4109
สถาบันสังคมส่งเคราะห์แห่งประเทศไทย	หมายเลขโทรศัพท์	02-246-1457-61
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	หมายเลขโทรศัพท์	02-245-7384
บ้านพักใจ	หมายเลขโทรศัพท์	02-234-2381 และ 02-234-8258
บ้านพักชุกเลิน	หมายเลขโทรศัพท์	02-929-2222
วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี	หมายเลขโทรศัพท์	036-413-805

สถานที่ให้บริการแต่ละแห่งจะมีรูปแบบ เวลา และลักษณะการให้บริการที่แตกต่าง กันไป หากคุณสนใจก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

---

\*นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต